

Liste des objectifs SENS

Module	Niveau de représentativité	Objectifs primaires	Objectifs secondaires	Objectifs optionnels
1- Démographie	Niveau ménage	<ul style="list-style-type: none"> Déterminer le profil démographique de la population ; Déterminer le ratio de dépendance démographique. 		
2- Anthropométrie et Santé	Niveau individu	<ul style="list-style-type: none"> Mesurer la prévalence de malnutrition aiguë chez les enfants âgés de 6 à 59 mois ; Mesurer la prévalence du retard de croissance chez les enfants âgés de 6 à 59 mois ; Déterminer la couverture vaccinale anti-rougeole chez les enfants âgés de 9 à 59 mois (ou groupe-cible spécifique selon le contexte, ex : 9-23 mois) ; Déterminer la couverture de la supplémentation en vitamine A au cours des 6 derniers mois chez les enfants âgés de 6 à 59 mois ; Déterminer la prévalence de diarrhée sur une période rétrospective de 2 semaines chez les enfants âgés de 6 à 59 mois. 	<ul style="list-style-type: none"> Déterminer l'enrôlement au sein des programmes nutritionnels supplémentaires ciblés (CRENAM) et thérapeutiques (CRENAS/CRENI) pour les enfants âgés de 6 à 59 mois ; Déterminer la couverture du programme d'alimentation supplémentaire de couverture (BSFP) pour les enfants âgés de 6 à 23 mois, de 6 à 36 mois et de 6 à 59 mois (si applicable) ; Déterminer la couverture du déparasitage (contrôle des vers parasites dits "helminthes" transmis par le sol) avec le mébendazole et/ou l'albendazole au cours des six derniers mois chez les jeunes enfants (inclure le groupe d'âge cible spécifique au contexte) (si applicable) ; Déterminer la couverture du programme d'alimentation supplémentaire de couverture (BSFP) pour les femmes enceintes et allaitantes avec un enfant de moins de 6 mois et âgées de 15 à 49 ans (si applicable). 	<ul style="list-style-type: none"> Déterminer l'utilisation des SRO et/ou des comprimés ou du sirop de zinc, au cours d'un épisode de diarrhée ; Déterminer la prévalence de la malnutrition selon le PB chez les femmes en âge de procréer, âgées entre 15 et 49 ans (préciser si toutes les femmes ou seulement les femmes enceintes et/ou allaitantes avec un enfant de moins de 6 mois sont mesurées) ; Déterminer la période d'arrivée des enfants dans le camp/pays d'asile.
3- Anémie	Niveau individu	<ul style="list-style-type: none"> Mesurer la prévalence de l'anémie chez les enfants âgés de 6 à 59 mois et les femmes en âge de procréer entre 15 et 49 ans (non-enceintes). 	<ul style="list-style-type: none"> Déterminer l'enrôlement en centres de soins prénataux et la couverture de la supplémentation en fer-acide folique chez les femmes enceintes. 	
4- ANJE	Niveau individu	<ul style="list-style-type: none"> Étudier les pratiques d'ANJE chez les enfants âgés de 0 à 23 mois. 		

Module	Niveau de représentativité	Objectifs primaires	Objectifs secondaires	Objectifs optionnels
5- Sécurité alimentaire	Niveau ménage	<ul style="list-style-type: none"> • Déterminer la capacité globale de la population à satisfaire ses besoins alimentaires avec l'assistance : <ol style="list-style-type: none"> a. Déterminer la période de temps pendant laquelle dure la distribution générale de vivres pour les ménages bénéficiaires (si applicable) ; b. Déterminer la couverture des ménages bénéficiant des transferts d'espèces et déterminer comment les ménages bénéficiaires dépensent l'argent reçu (si applicable) ; c. Déterminer la couverture des coupons alimentaires et comment les ménages bénéficiaires utilisent les coupons (si applicable) ; • Déterminer le niveau d'utilisation de stratégies d'adaptation négatives au sein des ménages ; • Évaluer la consommation alimentaire des ménages (quantité et qualité). 	<ul style="list-style-type: none"> • Déterminer la proportion de ménages appartenant à chacune des catégories de ciblage de l'assistance alimentaire (si applicable) ; • Déterminer l'accès de la population au combustible pour la cuisson et son utilisation (si applicable). 	
6- Couverture en provision de moustiquaires	Niveau ménage	<ul style="list-style-type: none"> • Déterminer la proportion de ménages qui possèdent une moustiquaire (tous types confondus et MILD) ; • Déterminer le niveau d'utilisation des moustiquaires (tous types confondus et MILD) par la population totale, les enfants de 0-59 mois et les femmes enceintes. 	<ul style="list-style-type: none"> • Déterminer le niveau de couverture en pulvérisations intra-domiciliaire d'insecticide à effet rémanent au sein des ménages au cours des 6/12 derniers mois (si applicable). 	
7- Eau, Assainissement et Hygiène	Niveau ménage	<ul style="list-style-type: none"> • Déterminer le niveau d'accès de la population à l'eau potable et aux systèmes d'hygiène et d'assainissement, ainsi que leur niveau d'utilisation ; • Déterminer le niveau d'accès de la population au savon. 		